Aves del Recinto Universitario de Mayagüez

CARLOS A. DELANNOY JULIÁ Y JOSÉ A. MARI MUT

Aves del Recinto Universitario de Mayagüez

Una guía a las aves observadas en el campus de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez

© 2011-2013, 2024, 2026 Ediciones Digitales, Aguadilla, Puerto Rico.

Esta obra puede usarse libremente con propósitos educativos, sin fines de lucro.

Introducción

El campus del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM) tiene paisajes ecológicos que sirven de hogar permanente o temporero para una interesante y variada comunidad de aves. Nuestra lista de 72 especies es producto de observaciones y anotaciones hechas por el primer autor durante más de tres décadas de recorridos por el campus. La hemos complementado con información general obtenida de varias fuentes y con fotografías tomadas por personas que se identifican en la última oración del texto de cada especie.

Diez de las especies son endémicas o autóctonas (únicas) de Puerto Rico: el Bienteveo, la Calandria, el Carpintero, el Comeñame, el Jui, el Múcaro Común, la Reina Mora, el San Pedrito, el Zumbador Dorado y el Zumbadorcito de Pueeto Rico.. Treinta y seis (la mitad) anidan en el recinto. Doce especies han sido introducidas como mascotas y han logrado revertir a su condición silvestre en Puerto Rico. Dieciséis son migrantes estacionales de Norteamérica, estas aves llegan mayormente durante el otoño y retornan a sus territorios de anidamiento durante la primavera. Tenemos dos aves parásitas, el Tordo Lustroso y la Viuda Colicinta, que depositan sus huevos en nidos de otras aves para que se los empollen y alimenten sus crías. Tres especies (la Paloma Doméstica, el Mozambique y el Tordo Lustroso) se convierten en plagas cuando pernoctan en grandes grupos y su excremento daña la propiedad o afecta la salud.

Las aves han evolucionado estrategias diversas para alimentarse, escapar de sus depredadores y reproducirse. Por lo tanto, no se distribuyen uniformemente a través del campus ni se encuentran siempre en los mismos lugares. Su actividad también varía durante el día, algunas se observan por la mañana, otras por la tarde y el múcaro solamente cuando está oscuro. Los hábitats principales para observar aves son:

Arboledas y franjas de bosque- las arboledas y franjas de bosque de nuestro campus ofrecen a las aves lugares para alimentarse, pernoctar, descansar y reproducirse. Las mejores arboledas y franjas de bosque para observar aves se encuentran en la Finca Alzamora, alrededor de los edificios de Ingeniería Química y Civil, detrás de los edificios de Administración de Empresas, Biología, Ciencias Agrícolas y la residencia del Rector, y entre Servicios Médicos y el Centro de Estudiantes.

Patios y espacios abiertos- los patios y espacios abiertos de nuestro campus ofrecen a las aves principalmente alimento. Los mejores espacios abiertos y patios para observar aves se encuentran entre la Biblioteca General, el Centro de Estudiantes y el Edificio Chardón, al costado del Coliseo Rafael Mangual, y en el viejo campo atlético frente a la Cervecera de Puerto Rico.

Quebrada de Oro- La Quebrada de Oro entra al campus por detrás del edificio de Biología y sale por debajo de la carretera número 2 para desembocar en el barrio El Seco. Este hábitat ofrece a las aves alimento y agua. Las tórtolas y palomas bajan frecuentemente al lecho de la quebrada a tomar agua, mientras que las garzas vadean regularmente en busca de alimento. La quebrada ofrece diversos hábitats a lo largo de su paso por el recinto.

Referencias

Alderfer, J. 2006. Complete Birds of North America. National Geographic Society, Washington, D. C. 664 pp.

Biaggi, V. 1997. Las Aves de Puerto Rico. Cuarta Edición. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. 389 pp.

Camacho Rodríguez, M., J. Chabert Llompart y M. López Flores. 1999. Guía para la identificación de las aves exóticas establecidas en Puerto Rico. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 52 pp.

List of Birds of Puerto Rico. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_birds_of_Puerto_Rico

Oberle, M. W. 2006. Puerto Rico's Birds in Photographs. A complete Guide and CD-ROM including the Virgin Islands. Second Edition. Editorial Humanitas, Seattle, Washington. 132 pp.

Raffaele, H. A. 1989. A Guide to the Birds of Puerto Rico and the Virgin Islands. Princeton University Press, London. 254 pp.

Raffaele, H., J. Wiley, O. Garrido, A. Keith y J. Raffaele. 1998. A guide to the Birds of the West Indies. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 511 pp.

Sibley, D. A. 2001. National Audubon Society, The Sibley Guide to Birds. Published by Alfred A. Knopf, Inc., New York, USA. 545 pp.

Las aves



Aquí se incluyen las 72 especies de aves que se han observado en el Recinto Universitario de Mayagüez, ordenadas alfabéticamente por familia y por nombre común dentro de cada familia. Pueden dividirse en cuatro grupos:

Aves autóctonas- las aves autóctonas habitan en la región geográfica donde se originaron, a menos que las hayamos llevado a otro lugar o hayan expandido naturalmente su distribución. Es significativo que en los ambientes artificiales del

campus se hayan visto 9 de nuestras 17 aves endémicas. Esto se debe a la capacidad de algunas aves para responder y adaptarse a hábitats dinámicos y cambiantes, lo que les predispone a sobrevivir exitosamente. Este es un dato alentador para el futuro de estas aves endémicas en una isla tan alterada ecológicamente como Puerto Rico.

Aves residentes- estas aves viven y se reproducen en Puerto Rico. A este grupo pertenecen 55 de las 72 especies observadas en nuestro recinto y por lo tanto la mayoría de las especies que estudiantes, empleados y visitantes observarán. No se incluyen aquí aves endémicas ni exóticas, aunque también son residentes. La Golondrina de Iglesias, el Julián Chiví y el Querequequé son residentes que migran a Sudamérica en el otoño y regresan a la isla en la primavera.

Aves exóticas- estas aves introducidas han establecido poblaciones residentes. De las 12 especies de aves exóticas observadas en el campus, los pinzones (*finches*), las cotorras y los pericos son los más numerosos. La presencia de aves exóticas está estrechamente ligada a la actividad de importación para el mercado local de mascotas. Cabe mencionarse que la Cotorra Puertorriqueña sólo habita en El Yunque, en el Bosque de Río Abajo en Utuado y en el Bosque de Maricao, por lo que todos los avistamientos de esta cotorra en el campus corresponden a la Cotorra Cabeciblanca.

Inmigrantes invernales- estas aves inician su jornada migratoria otoñal en Norteamérica y se detienen durante un tiempo en Puerto Rico para alimentarse y engordar. La mayoría sigue viaje hacia destinos en Sudamérica. Durante su estadía en la isla, estos visitantes interaccionan con nuestra biota y contribuyen a la diversidad de la región. Las reinitas migratorias (*wood warblers*), los chorlos y los playeros (*shorebirds*) son las especies más numerosas de este grupo en el recinto.

Guaraguao Colirrojo (*Buteo jamaicensis*)

El Guaraguao Colirrojo (*Red-tailed Hawk*) reside todo el año en Puerto Rico. Nuestra población es suplementada por aves que llegan desde Norteamérica durante el invierno. Anida desde Alaska hasta Panamá y a través de las Antillas. Mide unas 24 pulgadas (las hembras son más grandes). Suele verse planeando sobre una gran variedad de hábitats en búsqueda de alimento, que incluye lagartijos, iguanas, culebras, aves, ratas y mangostas. Anida de enero a julio. La pareja amontona ramas alto en un árbol para construir un nido de plataforma en el cual la hembra pone dos o tres huevos blancos que ambos incuban por unos 35 días. Durante el cortejo y defensa del territorio emiten una vocalización fuerte y penetrante que se escucha a distancia.

Se distingue por el plumaje dorsal pardo oscuro, el pecho blanco, el vientre blanco con estrías pardas y la cola rojiza. Las patas son amarillas. La punta del pico es negra. Los dos sexos son similares. El Guaraguao es el ave rapaz más abundante y con distribución más amplia en Puerto Rico. En otros lugares se emplea en el deporte de la cetrería para cazar aves y demás presas.

En la universidad se observa planeando cerca de arboledas. Anida en franjas de bosque en la Finca Alzamora, detrás del edificio de Ciencias Agrícolas, en el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Marvin Collins.

Martín Pescador (*Megaceryle alcyon*)

El Martín Pescador (*Belted Kingfisher*) nos visita de septiembre a mayo. Anida a través de Norteamérica y migra a las Antillas y el noroeste de Sudamérica. Algunos individuos jóvenes permanecen en la Isla todo el año. Mide hasta 13 pulgadas. Frecuenta los márgenes de quebradas, ríos, charcas y manglares con agua clara donde puede ver a sus presas mientras se posa en la vegetación aledaña. Cuando detecta un pez, crustáceo, larva de insecto o algún animal que ha caído al agua, se tira en picada y se zambulle para atraparlo. También vuela suspendido sobre el agua en lo que ubica la presa. Tanto los machos como las hembras defienden el territorio donde se alimentan. En Norteamérica la pareja construye un túnel largo en suelo fangoso cerca del agua. La hembra deposita de seis a siete huevos que ambos empollan por hasta 24 días. Los padres alimentan a los jóvenes durante varias semanas y les enseñan a pescar.

Se distingue por el plumaje azul cenizo, el cuello y el vientre blancos, la llamativa cresta o penacho en la cabeza, el pico grande y grueso, y las patas cortas. El vientre del macho es blanco, mientras que el de la hembra tiene una banda ventral rojiza.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto por Alejandro Sánchez.

Chiriría Antillana (*Dendrocygna arborea*)

La Chiriría Antillana (*West Indian whistling duck*) reside todo el año en Puerto Rico y puede verse con regularidad en la Laguna Cartagena de Lajas. El primer autor la ha observado una vez en el Caño La Boquilla, no lejos de la universidad. Mide hasta 23 pulgadas. Su nombre en inglés alude a su llamada, que ha sido descrita como “un silbido agudo y fuerte: "pip-pip-pip-uiiiiaaaa usualmente emitido cuando están agitados o en vuelo”. Como otros miembros de la familia, frecuenta cuerpos de agua, aunque a menudo se posa en árboles, lo que se refleja en su nombre científico. El ejemplar en la foto es uno de 27 encontrados por el fotógrafo en un árbol de samán en Cabo Rojo. Se alimenta mayormente de noche y uno de sus alimentos favoritos es el fruto de la palma real. Anida al parecer mayormente de agosto a diciembre, en árboles y lugares protegidos en el suelo.

Se distingue por su pico negro, cuello largo, pecho y dorso pardos y el vientre crema y negro. La cacería redujo su población a través de la isla, pero gracias a su prohibición la especie se ve hoy con más frecuencia. La Chiriría ha sido declarada ave simbólica de Cataño, donde por ordenanza se prohibe cazarla.

El primer autor lo observó en junio de 2023 en La Quebrada de Oro. Foto por Francisco Moll.

Garza Azul (*Egretta caerulea*)

La Garza Azul (*Little Blue Heron*) reside todo el año en Puerto Rico. A uestra población se suman aves que llegan de Norteamérica durante el invierno. Anida desde el sureste de los Estados Unidos hasta Uruguay y a través de las Antillas. Mide hasta 29 pulgadas. Frecuenta charcas, lagunas, canales, quebradas, pastizales anegados y la orilla del mar durante la marea baja. Se alimenta de crustáceos, peces, sapitos y lagartijos que captura acercándose lentamente o permaneciendo inmóvil hasta que detecta la presa, entonces la arponea con el pico. Anida junto a otras garzas en colonias sobre la vegetación de los cuerpos de agua. La pareja construye un nido de plataforma con palitos en el que la hembra deposita de dos a cuatro huevos azul-verdosos que ambos empollan.

Se distingue por el color azul cenizo con plumas violáceas en la cabeza y el cuello, el pico gris con la punta oscura y las patas grises. Durante su primer año son blancas y cuando mudan hacia el plumaje de adulto son blancas y azules, los que le da una apariencia veteada y el nombre de garza pinta. Durante el periodo reproductivo desarrolla plumas largas en la cabeza y el cuello se torna más rojizo. Antiguamente se cazaba para alimento.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto por Alejandro Sánchez.

Garza Blanca (*Egretta thula*)

La Garza Blanca (*Snowy Egret)* reside todo el año en Puerto Rico. A nuestra población se suman aves que llegan desde Norteamérica durante el invierno. Anida desde el centro de los Estados Unidos hasta el norte de la Argentina y a través de las Antillas. Mide unas 24 pulgadas. Frecuenta lagunas, ciénagas y la desembocadura de los ríos, donde se alimenta de crustáceos, peces, renacuajos, sapitos y lagartijos que captura acercándose cuidadosamente y arponeándolos con el pico. También vibra las patas sobre el lodo del fondo para exponer a las presas y a veces abre las alas súbitamente para asustarlas. Anida junto a otras garzas en colonias formadas sobre la vegetación de los cuerpos de agua. La pareja construye un nido de plataforma con palitos en el que la hembra deposita de dos a cinco huevos verde-azules que ambos empollan durante unas tres semanas.

Se distingue por el plumaje blanco, con el pico negro (la base amarilla se torna roja durante el periodo reproductivo), patas mayormente negras y dedos amarillos. Durante el periodo de apareamiento desarrolla vistosas plumas largas en el cuello y el lomo; su población se redujo mucho hacia finales del siglo 19 y comienzos del siglo 20 debido a la cacería para usar estas plumas en sombreros para damas.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto por José Mari.

Garza Ganadera (*Ardea ibis*)

La Garza Ganadera (*Cattle Egret*) reside todo el año en Puerto Rico. Es nativa de Asia tropical, Madagascar, África y la Península Ibérica. Voló de África a Sudamérica durante el siglo pasado y migró hacia el norte, colonizando todo el territorio hasta el norte de los Estados Unidos. A Puerto Rico llegó en el 1948. Mide unas 20 pulgadas. Abunda en pastizales, a lo largo de carreteras y en predios con animales de la finca y maquinaria agrícola. Es común verla cerca de vacas y caballos, alimentándose de los insectos, coquíes y lagartijos que escapan del paso de los animales y las máquinas. También frecuenta los vertederos. Pasa la noche en bandadas grandes sobre los árboles y anida junto a otras garzas en la vegetación de manglares y pantanos. La hembra construye un nido de plataforma con palitos que le provee el macho y deposita tres o cuatro huevos azules que ambos empollan durante poco más de tres semanas.

Se distingue por el plumaje blanco, pico corto amarillo, cuello relativamente corto y patas amarillo-verdosas. Durante el periodo de apareamiento el pico y las patas se tornan rojizas y aparecen plumas crema-dorado sobre la cabeza, el pecho y la espalda.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en espacios abiertos y en algunos patios. Foto por José Almodóvar.

Garza Pechiblanca (*Egretta tricolor*)

La Garza Pechiblanca (*Tricolored Heron*) reside todo el año en Puerto Rico. Nuestra población es suplementada por aves que llegan de Norteamérica durante el invierno. Anida desde los Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica (Brazil y Perú) y las Antillas. Mide hasta 26 pulgadas de largo. Frecuenta pantanos, manglares, lagunas y otros cuerpos de agua poco profundos, tanto salobres como de agua dulce donde se alimenta de peces, complementando la dieta con camarones, cangrejos y anfibios. A menudo persigue la presa corriendo con las alas extendidas, cambiando de dirección rápidamente y con precisión. Anida a menudo junto a otras garzas en árboles cercanos a los cuerpos de agua. La hembra construye un nido de plataforma con palitos que le provee el macho y deposita tres o cuatro huevos azules que ambos incuban por unos 25 días.

Se distingue por el plumaje azul-grisáceo, el vientre y los muslos blancos, y una línea angosta de plumas blancas que corre desde la garganta hasta el pecho. El pico es recto, amarillo o grisáceo con la punta negra. Las patas son amarillo-verdosas. Es una garza solitaria y arisca.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto por Miguel Landestoy.

Garza Real (*Ardea alba*)

La Garza Real (*Great Egret*) reside todo el año en Puerto Rico. Nuestra población es suplementada por aves que llegan desde Norteamérica durante el invierno. Anida desde el centro de los Estados Unidos hasta la Argentina y a través de las Antillas, también es común en África y Asia. Mide unas 40 pulgadas. Frecuenta charcas, lagunas, canales, quebradas y pastizales anegados, donde se alimenta de peces y crustáceos, aunque también come sapitos, lagartijos y aves pequeñas que captura caminando lentamente o permaneciendo inmóvil hasta que la presa se acerca, luego la arponea con el pico. Anida sobre árboles que se proyectan sobre lagunas y otros cuerpos de agua grandes. La pareja construye un nido de plataforma con palitos en el que se depositan de tres a cinco huevos azulosos que ambos empollan durante unos veinticinco días.

Se distingue por el plumaje blanco, pico amarillo grueso, cuello largo en forma de S y patas negras. Durante el periodo de apareamiento le crecen en la base del cuello y en la espalda varias plumas largas; su población se redujo mucho a comienzos del siglo pasado debido a la cacería para usar las plumas en la confección de sombreros. Las poblaciones ya se han recuperado.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. También visita patios y los estanques frente al Edificio Monzón. Foto por Olivier Vimont.

Martinete (*Butorides virescens*)

El Martinete (*Green Heron*) reside todo el año en Puerto Rico. Nuestra población es suplementada por aves que llegan de Norteamérica durante el invierno. Anida desde el norte de los Estados Unidos hasta Uruguay y a través de las Antillas. Mide hasta 18 pulgadas. Frecuenta charcas, lagunas, canales, quebradas, pastizales anegados, patios y jardines en búsqueda de peces, crustáceos, sapitos y lagartijos que captura permaneciendo inmóvil hasta que la presa se acerca y la arponea. Algunos individuos tiran al agua ramitas, lombrices o insectos como carnada para atraer las presas. La pareja anida sola o en grupos pequeños sobre la vegetación dentro de los manglares y entre cepas de bambú a orillas de ríos. La hembra construye un nido con palitos que le provee el macho y deposita de dos a cinco huevos azulosos que ambos empollan por unos 21 días.

Se distingue por el plumaje azul-verdoso oscuro, cuello rojizo, pecho con estrías blancas, pico recto y patas amarillo-verdosas. El color de las plumas y las patas se intensifica durante el periodo de apareamiento. Los dos sexos son parecidos. Los jóvenes son más pálidos.

En la universidad se observa cerca de la Quebrada de Oro y de los estanques frente al Edificio Monzón. Se encontró en una ocasión anidando en ramas sobre la Quebrada de Oro, al costado del edificio de Ingeniería Química. Foto por: José Mari.

Yaboa Común (*Nyctanassa violacea*)

La Yaboa Común (*Yellow-crowned Night-Heron*) reside todo el año en Puerto Rico. Nuestra población es suplementada por aves que llegan desde Norteamérica durante el invierno. Anida desde el sureste de los Estados Unidos hasta el sureste de Brasil y en las Antillas. Mide unas 24 pulgadas. Caza mayormente de noche en charcas, lagunas, canales, quebradas, pastizales anegados y patios, donde encuentra cangrejos, moluscos, insectos, peces, sapitos, lagartijos, culebras, huevos y pichones de otras aves. A menudo permanece quieta por largo rato hasta que se acerque la presa. Su presencia en los patios se descubre a menudo cuando grazna. Anida en colonias pequeñas, a veces con otras garzas, en la copa de árboles cerca o lejos de cuerpos de agua. La pareja construye un nido de palitos donde la hembra pone de dos a cinco huevos azulados que ambos empollan por unos veinticinco días.

Se distingue por el plumaje azul-grisáceo, la cabeza negra con franjas blancas en el dorso y debajo de los ojos, y las patas amarillo-verdosas (rojizas durante el periodo de apareamiento). El pico es negro, grueso y recto. Los jóvenes tienen estrías blancas y pardas en todo el cuerpo.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto por Pericles Brea.

Yaboa Real (*Nycticorax nycticorax*)

La Yaboa Real (*Black-crowned Night-Heron*) reside todo el año en Puerto Rico. Nuestra población es suplementada por aves que llegan desde Norteamérica entre octubre y abril cada año. Se encuentra a través de todo el nuevo mundo. En el viejo mundo se encuentra en Europa, África, India, China, Rusia, sureste de Asia y Hawái. Mide unas 25 pulgadas. Caza mayormente de noche en ciénagas, charcas, lagunas, ríos y quebradas, donde busca camarones, cangrejos, moluscos, insectos, peces, ranas, sapos, lagartos, culebras, y huevos y pichones de otras aves. Permanece quieta por largo rato en espera que se acerque su presa y la atrapa con un movimiento rápido del pico. Construye su nido de plataforma con palitos y ramitas en lo alto de un árbol en colonias pequeñas o grandes junto a otras garzas. La hembra pone de dos a cinco huevos azulosos que se incuban por 25 días.

Se distingue por las plumas negras en la cabeza y espalda, el cuello, pecho, y muslos blancos, y resto del cuerpo gris. Tiene el pico recto, grueso y negro, y las patas amarillas. Los jóvenes tienen plumaje marrón claro, estrías marrón en el pecho y vientre, y manchas blancas grandes en los bordes de sus alas.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto por Mike Baird.

Querequequé (*Chordeiles gundlachii*)

El Querequequé (*Antillean Nighthawk*) reside en Puerto Rico de abril a septiembre, luego de lo cual parte a pasar el invierno en Sudamérica. Anida también en los cayos de la Florida, en las Bahamas, a través de las Antillas Mayores y en las Islas Vírgenes. Mide hasta 8 pulgadas. Habita en áreas abiertas, bosques costeros, fincas y pastizales. Se le observa generalmente al amanecer o al atardecer, cuando vuela en lo alto, cambiando de dirección y emitiendo su voz querequeqé mientras captura una variedad de insectos al vuelo. Anida en mayo y junio, directamente sobre una leve depresión en la gravilla del suelo. La hembra pone uno o dos huevos y los empolla por unos 20 días. Durante el cortejo el macho se tira una y otra vez en picada hasta casi tocar el suelo.

Se distingue por su plumaje dorsal pardo con pintas, plumaje ventral pálido con barras pardas y garganta pálida (blanca en el macho y crema en la hembra). El pico es muy corto (aunque la boca es grande) y las patas son pequeñas. En vuelo se distingue por sus alas largas, cada una con una mancha blanca.

Se observa volando sobre el recinto al atardecer. En una ocasión se observó anidando en el techo del Edificio Chardón. Foto por Rafael Rodríguez.

Chorlito sabanero (*Charadrius vociferus*)

El Chorlito Sabanero (*Killdeer*) reside todo el año en Puerto Rico. Nuestra población es suplementada por aves que llegan desde Norteamérica durante el invierno. Anida desde el sur de Alaska hasta el sur de México, en las Antillas Mayores y en el norte y oeste de Sudamérica. Mide unas 10 pulgadas. Frecuenta bordes de charcas, lagos, quebradas y ríos, pastizales inundados, orillas de lodazales, cañaverales, campos de golf y césped de patios, donde corre, se detiene y corre nuevamente en búsqueda de caracoles, gusanos e insectos. Anida entre la vegetación del suelo, a menudo lejos del agua. El macho escarba una depresión sobre la gravilla del suelo en un área bien camuflada. La hembra deposita tres o cuatro huevos de color crema con manchas pardo oscuro que ambos empollan durante unas cuatro semanas.

Se distingue por las dos bandas negras sobre el cuello y el pecho blanco, las patas amarillosas y el borde rojo alrededor del ojo. La cabeza es marrón, con la frente blanca y una banda negra entre los ojos. Las plumas de la espalda, alas y cola son pardas. El pico es negro, delgado y recto. Cuando vuela se observa claramente una línea de plumas blancas a lo largo del ala. Los sexos son similares.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro y en el césped inundado del campo atlético viejo y de los alrededores del coliseo. Foto por Lucas Limonta.

Paloma Doméstica (*Columba livia*)

La Paloma Doméstica o Paloma Común (*Rock Pigeon*) reside todo el año en Puerto Rico. Es nativa de Europa y Asia pero ha sido introducida a zonas urbanas alrededor del mundo. Mide unas 14 pulgadas. Forma bandadas en parques, plazas públicas y otras áreas, donde se alimenta de sobras de alimento, pan, maíz y semillas. Anida todo el año en edificaciones diversas. Construye un nido de plataforma con palitos y fibras vegetales donde la hembra pone dos huevos blancos que ambos padres empollan durante unos 17 días.

El plumaje es muy variable debido a los muchos años de domesticación, pero todavía abunda la coloración original gris con plumas iridiscentes en el cuello y el pecho. Las patas son rojizas y el pico es negro, blando y recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales. La iridiscencia de las plumas es más intensa en el macho. Se ha convertido en una plaga en algunos lugares porque su excreta ácida daña la superficie de edificios, automóviles, puentes, estatuas y plazas públicas. En muchos lugares se han puesto mallas y púas para evitar su anidamiento.

En la universidad se observa en los alrededores de la cafetería alimentándose de sobras. En patios, jardines y espacios abiertos se alimenta de semillas. Anida en los aleros de edificios del recinto. Foto por Mark Oberle.

Paloma Turca (*Patagioenas squamosa*)

La Paloma Turca (*Scaly-naped Pigeon*) reside todo el año en Puerto Rico. Es la paloma más grande en la isla. Habita a través de las Antillas con la excepción de las Bahamas y Jamaica. Mide hasta 16 pulgadas. Vive en bosques, fincas y arboledas cercanas a áreas urbanas, donde se alimenta de frutas, semillas y caracoles que recoge del suelo o remueve de la vegetación. Anida mayormente de marzo a julio. Construye una plataforma de palitos en una rama, sobre una bromelia arbórea, o entre hojas de palma, y en el suelo de islotes libres de depredadores. Pone uno o dos huevos blancos que ambos adultos incuban por 15 días.

Se distingue por la cabeza, cuello y pecho de color púrpura, con el resto del cuerpo gris; las plumas del cuello parecen escamas. Tiene un anillo rojo y otro amarillento o crema alrededor de cada ojo. Las patas son rosadas o rojizas y el pico es blando y recto, con opérculos o tapitas rojizas cubriendo las aperturas nasales. Los dos sexos son similares pero la coloración del macho es más intensa.

En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque y en las palmas reales del campus. Anida en la Finca Alzamora, cerca del complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Richard Crook.

Rolita (*Columbina passerina*)

La Rolita (*Common Ground Dove*) reside todo el año en Puerto Rico. Es la paloma más pequeña en la isla y una de las más abundantes. Habita en el sur de los Estados Unidos, las Antillas, México, Centroamérica y Sudamérica hasta Ecuador y Brasil. Mide hasta 7 pulgadas de largo. Anda casi siempre en parejas, cabeceando mientras busca semillas y frutas que recoge del suelo en bordes de zonas boscosas, fincas, cañaverales, caminos rurales, campos de golf, jardines, calles y patios. Es fácil de atraer a comederos artificiales. Se reproduce todo el año. Construye un nido de fibras vegetales o una plataforma con palitos en un arbusto, árbol, cavidad, tiesto o sobre el suelo. Pone dos huevos blancos que ambos adultos incuban por unos 14 días.

Se distingue por el color grisáceo o marrón oscuro, con manchas oscuras en las alas y un patrón de plumas "escamosas" en la cabeza y pecho. Las patas son rosadas y el pico es blando y recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales. Los dos sexos son similares pero la coloración del macho es más intensa. Cuando vuela se nota una mancha pardo-rojiza en cada ala.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios a través el recinto. Anida en arbustos y entre helechos en los patios del recinto, también en las ventanas de algunos edificios. Foto por Lucas Limonta.

Tórtola Aliblanca (*Zenaida asiatica*)

La Tórtola Aliblanca (*White-winged Dove*) reside todo el año en Puerto Rico. Forma numerosas bandadas desde el final del verano hasta el invierno. Habita desde el sur de los Estados Unidos hasta Panamá, de Ecuador hasta el norte de Chile y de las Bahamas a la Islas Vírgenes. Mide hasta 12 pulgadas de largo. Se alimenta de semillas y frutas que encuentra en bordes de bosques, fincas, cañaverales, matorrales, manglares, caminos, campos de golf, jardines y patios. Acude a comederos artificiales y defiende su posición agresivamente contra otras aves. Se reproducen casi todo el año en zonas urbanas, donde varias parejas construyen nidos de plataforma en una misma rama. La hembra pone dos huevos blancos que ambos adultos incuban por unos 14 días.

Se distingue por el plumaje pardo-grisáceo y el llamativo borde blanco en el ala. Tiene además una mancha azul alrededor del ojo, una banda oscura debajo de cada ojo y patas rojas. Los dos sexos son parecidos. Los jóvenes tienen una coloración más tenue y no poseen el anillo azuloso alrededor de los ojos. El pico es blando y recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales.

En la universidad se observa a orillas de la Quebrada de Oro, en patios y jardines. Anida en árboles de maría, kamani y úcar, a veces junto a mozambiques. Foto por José Mari.

Tórtola Cardosantera (*Zenaida aurita*)

La Tórtola Cardosantera (*Zenaida Dove*) reside todo el año en Puerto Rico. Su abundancia aquí ha disminuido según ha aumentado la de la Tórtola Aliblanca. Habita en las Islas Bahamas, la península de Yucatán, las Antillas Mayores y las Antillas Menores hasta Granada. Mide hasta 12 pulgadas. Visita bordes de bosques húmedos y secos, fincas, cañaverales, manglares, caminos, campos de golf, patios y jardines. Se alimenta de una gran diversidad de semillas y frutas que generalmente consigue en el suelo. Acude a comederos y come maíz en compañía de otras palomas y gallinas. Se reproduce mayormente de febrero a junio. Construye un nido de plataforma con palitos en la rama de un árbol, arbusto, cactus, o palma. La hembra pone dos huevos blancos que ambos adultos empollan por unos 15 días.

Se distingue por el plumaje pardo con puntos negros, una franja blanca en las alas, dos líneas azul oscuro detrás del ojo y una mancha violácea iridiscente en el cuello. Las patas son rojizas y el pico es negro, blando y recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales. Los dos sexos son parecidos. Al remontar el vuelo las alas producen un zumbido distintivo.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboleda, donde también anida. Foto por José Mari.

Tórtola Collarina (*Streptopelia risoria*)

La Tórtola Collarina (*Ringed Turtle-Dove*) se introdujo a Puerto Rico hace mucho tiempo como mascota y para consumo humano. El consenso actual es que se trata de la forma domesticada de *Streptopelia roseogrisea* (*African Collared-Dove*), una especie africana con la cual puede cruzarse libremente. Mide unas 10 pulgadas. Visita patios, jardines, parques y calles de ciudades en búsqueda de semillas e insectos. También acude a comederos para aves. A menudo se posa en los cables eléctricos. La pareja se corteja y se aparea en la primavera, construyen un nido de plataforma y ponen dos huevos blancos que ambos empollan por 14 días.

El plumaje es muy variable debido a los muchos años de domesticación, la variedad más común es gris pálido o crema, con marrón pálido en la espalda y alas, y un collar negro en la nuca. Los dos sexos son parecidos. La cola es larga, las patas rosadas o anaranjadas, los ojos rojos y el pico gris oscuro, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales. La variedad blanca de esta dócil paloma es comúnmente usada en trucos de magia.

En la universidad se observa a media mañana tomando agua en la Quebrada de Oro, cerca del Coliseo Rafael Mangual. Foto por Alwyn Simple.

Garrapatero (*Crotophaga ani*)

El Garrapatero o Judío (*Smooth-billed Ani)* reside todo el año en Puerto Rico. Habita en el sur de la Florida, las Bahamas, parte de Centroamérica, a través de las Antillas y en Sudamérica hasta el norte de Argentina. Mide unas 13 pulgadas (los machos son más grandes). Vuela en bandadas pequeñas por arboledas, malezas, fincas, cañaverales, solares baldíos y patios en búsqueda de insectos, arañas, coquíes, lagartijos, huevos de aves y frutas. Ocasionalmente se posan en el lomo del ganado vacuno. A menudo la bandada completa se posa apiñada sobre una rama. Anida mayormente de junio a agosto. La bandada establece y defiende un territorio donde construyen sobre un árbol un solo nido grande en forma de taza. Las hembras depositan camadas sucesivas de cuatro o cinco huevos azulosos y todos los miembros del grupo los empollan durante unos 14 días. Sin embargo, por lo general sólo prosperan los huevos de la última camada.

Se distingue por el plumaje negro, rabo largo y pico con una cresta o quilla superior que le da cierta apariencia de cotorra. Las plumas de la cabeza y el cuello tienen márgenes violáceos.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Anida en franjas boscosas en la Finca Alzamora. Foto por Lucas Limonta.

Pájaro Bobo Menor (*Coccyzus minor*)

El Pájaro Bobo Menor (*Mangrove Cuckoo*) reside todo el año en Puerto Rico. Abunda y tiene una amplia distribución en la isla. Habita en el sur de la Florida, en Centroamérica, de Venezuela a Brasil y en casi todas las Antillas. Mide unas 13 pulgadas. Vive en bosques húmedos y secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, manglares, y franjas espesas de bosque cerca de áreas urbanas. Se mueve entre el follaje denso, enredaderas y bejucos en búsqueda de insectos, arañas, moluscos, sapitos, lagartijos, frutas, huevos y pichones de pájaros pequeños. Mientras cazan abren su larga y llamativa cola. Anida probablemente durante todo el año. Construyen con ramitas un nido de plataforma en un árbol y empollan dos o tres huevos de color azul verdoso.

Se distingue por la cabeza, espalda, alas y cola de color gris, con la garganta, pecho, abdomen y flancos amarillentos o color salmón. Los ojos tienen una máscara negra. La cola es muy larga y posee tres pares de manchas blancas. El pico es curvo, pardo oscuro en la mandíbula superior y amarillento en la mandíbula inferior. Las patas son gris oscuro. Los dos sexos son parecidos.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Lucas Limonta.

Comeñame (*Melopyrrha portoricensis*)



El Comeñame (*Puerto Rican Bullfinch*) es autóctono o único de Puerto Rico. Mide unas 7.5 pulgadas (el macho es un poco más grande). Habita principalmente en bosques húmedos y secos, en cafetales bajo sombra y en franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Se alimenta de una gran variedad de semillas y frutas, además de capullos de flores, insectos, arañas y moluscos. En ocasiones se cuelga de una ramita estirando su cuerpo para alcanzar las frutas. El macho es muy agresivo al inicio de la temporada de crianza y las disputas territoriales con otros machos son frecuentes. Anida mayormente de febrero a junio. El nido tiene forma de taza o domo, con una entrada grande por el lado. La hembra pone generalmente tres huevos verdosos.

Se distingue por el color negro con manchas anaranjadas en la cabeza, garganta, y debajo de la cola. Las patas son negras, al igual que el grueso pico cónico. Los dos sexos son similares. Los jóvenes son verde oscuro, con color rojizo o pardo oscuro en la cabeza, garganta y debajo de la cola.

En la universidad se observa en franjas de bosque y en la Finca Alzamora. Anida en fragmentos de bosque en la Finca Alzamora y detrás de los edificios de Administración de Empresas y Biología. Foto por Lucas Limonta.

Gorrión Azafrán (*Sicalis flaveola*)

El Gorrión Azafrán (*Saffron Finch*) reside todo el año en Puerto Rico. Fue introducido desde Sudamérica alrededor del 1960 y ha ido propagándose a lo largo de los llanos costeros. Habita desde Colombia y Venezuela hasta el norte de Argentina. Mide unas 5.5 pulgadas. Se alimenta de semillas de hierbas y de algunos insectos que consigue mayormente en el césped de campos de golf, jardines y residencias. Anida de agosto a octubre. La pareja construye un nido con forma de copa en cavidades naturales o artificiales y en pencas de palmas. La hembra pone de tres a cinco huevos blancuzcos con pintas pardas que ella misma empolla durante unos 14 días. El macho es muy agresivo durante el periodo reproductivo.

Se distingue por el plumaje amarillo, con parte de la cabeza anaranjada. La hembra tiene menos color naranja. Los jóvenes son blancos, con líneas pardas en el pecho y el vientre. La mitad superior del pico es gris oscuro y la mitad inferior es crema. En Brasil se le llama canario de tierra por su color, canto y costumbre de buscar semillas de hierbas cerca del suelo. En algunos lugares se mantiene en jaulas.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Sólo se ha observado anidando en palmas frente a la Imprenta Colegial. Foto por Bertrando Campos.

Gorrión Barba Amarilla (*Tiaris olivaceus*)

El Gorrión Barba Amarilla (*Yellow-faced Grassquit*) reside todo el año en Puerto Rico. Habita desde México hasta Colombia, en el norte de Venezuela y en las Antillas Mayores. Mide unas 4.5 pulgadas (el macho es un poco más grande). Vuela en bandadas pequeñas, a menudo con otros gorriones, en búsqueda de semillas que consigue dondequiera que abunden las hierbas, como en bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, zanjas, sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas urbanas. También come pequeños insectos, arañas, néctar y frutas. Anida mayormente de marzo y abril. La hembra construye a poca altura del suelo un nido globular compacto con el interior forrado de fibras vegetales suaves y deposita de dos a cuatro huevos azulosos con pintas pardas que empolla por unos 13 días.

El macho es verde oliva, con el pecho negro y franjas amarillas en la cabeza y la garganta. El pecho de la hembra y de los jóvenes es verde oliva y las franjas amarillas son muy muy pálidas o están ausentes. El pico es cónico y negro, las patas son grises.

En la universidad se observa con más frecuencia comiendo semillas de pastizales en la Finca Alzamora. Foto por Gloria Archilla.

Gorrión Negro (*Melanospiza bicolor*)

El Gorrión Negro (*Black-faced Grassquit*) reside todo el año en Puerto Rico y es una de las aves más comunes de la Isla. Vive también en todas las islas del Caribe (menos Cuba) y en el norte de Sudamérica. Mide unas 4 pulgadas. Vuela en parejas o en bandadas en búsqueda de semillas y frutas que consigue dondequiera que abunden las hierbas, como en bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, zanjas, sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas urbanas. Es fácil de atraer a comederos artificiales con azúcar y semillas. Se reproduce todo el año. Construye, generalmente en arbustos a poca altura del suelo, un nido en forma de taza o de domo con el interior forrado de fibras vegetales finas. La hembra deposita de dos a cinco huevos blancos salpicados con manchas pardas y negras. En áreas urbanas puede anidar en tiestos, faroles y en la tela metálica de las ventanas.

Los machos son verde oliva con la cabeza, el pecho y el vientre negros. Las hembras son verde oliva con el plumaje ventral gris pálido. El pico es cónico y gris. Las patas son rosadas.

En la universidad se observa en hierbas a orillas de la Quebrada de Oro, en patios y en jardines. Anida en helechos y arbustos en muchos patios del campus. Foto por José Pantaleón.

Diablito (*Spermestes cucullata*)

El Diablito (*Bronze Mannikin*) reside todo el año en Puerto Rico. Es nativo de las sabanas de África y de islas cercanas en el Océano Índico. Se cree que llegó a Puerto Rico temprano durante el siglo 19 con el comercio de esclavos. Mide unas 4 pulgadas. Habita desde las montañas bajas hasta la costa. Vuela en bandadas en busca de semillas dondequiera que abunde la hierba, como en bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, bordes de zanjas, campos de golf, sabanas, ciénagas herbáceas, fincas con pastos y matorrales, y zonas urbanas. Cuando algo los asusta vuelan a una rama cercana y se posan bien pegados unos a otros. Se reproduce todo el año. Construye un nido en forma de domo en una palma, arbusto o árbol. También anida en ventanas y faroles. La hembra pone tres o cuatro huevos blancos que mayormente ella misma empolla.

Se distingue por la cabeza casi negra, con las plumas de la espalda pardo oscuro, un retículo de escamas negras en los flancos, y el vientre blanco. Los jóvenes tienen la capucha marrón pálido o carecen de ella y no tienen escamas en los flancos. El pico es cónico y las patas son grises.

En la universidad se observa en pastos a orillas de la Quebrada de Oro y en patios y jardines. Anida en la Finca Alzamora y los alrededores de la Imprenta Colegial, los edificios Celis y Monzón, y la casa del Rector. Foto por José Almodóvar.

Gorrión Canela (*Lonchura punctulata*)

El Gorrión Canela (*Nutmeg Mannikin*) reside todo el año en Puerto Rico. Fue introducido por el mercado de mascotas y se estableció en la década del 1970. Es nativo de Asia, desde India y Nepal hacia el este hasta China, y en el sureste de Asia y las Filipinas. Mide unas 4.5 pulgadas de largo. Viaja en bandadas con otros gorriones en busca de semillas que consigue dondequiera que abunden las hierbas, como en bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, zanjas, sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas urbanas. Durante la década del 1980 fue una plaga importante del cultivo local de arroz. Se reproduce mayormente en el verano y el otoño. Construye un nido en forma de domo muy grande y bastante oculto en una palma, arbusto o árbol. Pone de cuatro a seis huevos blancos.

Se distingue por la cabeza color canela, la espalda y el rabo pardo oscuro, y el vientre y los flancos cubiertos por plumas blancas con borde casi negro. Los dos sexos son similares. Los jóvenes son pardos, con la garganta, pecho y vientre más pálidos. El pico es cónico y gris oscuro.

En la universidad se observa en pastos a orillas de la Quebrada de Oro y en patios y jardines. Anida entre pencas de palmas y en árboles de *Ficus* en muchos lugares del campus. Foto por Michael Morel.

Veterano (*Estrilda melpoda*)

El Veterano (*Orange-cheeked Waxbill*) habita todo el año en Puerto Rico. Es nativo de las sabanas del centro y oeste de África. Se cree que ha sido introducido dos veces a la isla, la primera temprano en el siglo 19 con el comercio de esclavos y la segunda durante la década del 1950 por el mercado de mascotas. Mide unas 4 pulgadas. Abunda más en los llanos del sur de la Isla, donde puede verse en pastizales, predios agrícolas, orillas de carreteras, orillas de charcas y jardines. Vuela en bandadas, a menudo con otros gorriones buscando semillas de hierbas. Mientras forrajea mueve la cola de lado a lado. La pareja hace un nido de paja cerca del suelo, generalmente entre la base de las hierbas. También anida entre las láminas de las ventanas de las casas. El interior del nido es cubierto con materia vegetal blanda y plumas. La hembra pone cinco o seis huevos blancos que ambos adultos empollan durante unos 13 días.

Se distingue por el plumaje dorsal pardo y el ventral gris, con el pico, el área alrededor de los ojos y la base del rabo rojiza-anaranjada. Los dos sexos son similares. Los jóvenes no tienen la mancha en la mejilla y su pico es rosado.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Se ha observado anidando en pastizales en la Finca Alzamora. Foto por Gloria Archilla.

Halcón Común (*Falco sparverius*)

El Halcón Común (*American Kestrel*) reside todo el año en Puerto Rico, siendo el halcón más abundante en la isla. Nuestra población es suplementada por aves que llegan de Norteamérica durante el invierno. Habita en todo el hemisferio, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Mide hasta 12 pulgadas (las hembras son más grandes). Visita una gran variedad de hábitats en búsqueda de lagartijos, "iguanas", ciempiés, insectos, ratones, murciélagos y aves pequeñas. Anida mayormente de febrero a junio en la cavidad de un árbol, salientes de riscos, nidos artificiales (*nest boxes*) y conductos de ventilación en edificios. La hembra pone de tres a cinco huevos pardos con pintas oscuras que ambos incuban durante unos 30 días.

Se distingue por el plumaje dorsal pardo moteado de barras o puntos negros y por las dos barras negras verticales en los lados de la cabeza. Las plumas que cubren las alas son azules en el macho y pardas en la hembra, mientras que las plumas del rabo tienen una banda horizontal apical en el macho y muchas en la hembra. La base del pico, el anillo alrededor del ojo y las patas son amarillas.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios, por lo general mientras se posa alto en una rama, poste, antena o cable. Una pareja anidó por siete años consecutivos en una caja artificial cerca del edificio Luchetti. Foto por José Mari.

Halcón Migratorio (*Falco columbarius*)

El Halcón Migratorio (*Merlin*) nos visita de octubre a marzo. Habita a través de Norteamérica, el norte de Europa y Asia. Mide hasta 12 pulgadas (las hembras son más grandes). Visita una gran variedad de hábitats. En los salitrales ataca bandadas de playeros y en las lagunas caza insectos voladores. En el área de los mogotes ataca murciélagos. En áreas urbanas caza Tórtolas Aliblancas, Palomas Domésticas, Mozambiques y otras aves. En su distribución natural se reproduce mayormente en mayo y junio. Usa nidos abandonados por otras aves, huecos naturales en acantilados, cavidades en el suelo o huecos en edificios. La hembra deposita de tres a seis huevos pardos que empolla durante unos 30 días.

La espalda y las alas son gris azuloso en el macho y pardo oscuro en la hembra. El vientre y el pecho son blancos con estrías pardo oscuro. La cola tiene llamativas barras claras y oscuras. Las patas son amarillas. Debido a su gran agilidad aérea, es una de las especies empleadas en el deporte de la cetrería para cazar palomas y otras aves. Mientras está posado no balancea la cola hacia arriba y hacia abajo como lo hace el halcón común.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora o posado en lo alto de árboles de mangó en el campus. Foto por Richard Etlinger.

Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

El Halcón Peregrino (*Peregrine Falcon*) nos visita de octubre a abril. No anida en Puerto Rico pero vive en todos los continentes. Mide hasta 22 pulgadas de largo (las hembras son más grandes). Visita una gran variedad de hábitats y cuando ubica la presa se lanza en picada a gran velocidad. Ataca gaviotas, garzas, patos y playeros. En áreas urbanas se alimenta casi exclusivamente de Palomas Domésticas, descansando y pernoctando en aleros de edificios altos. En su distribución natural se reproduce durante la primavera. Usa nidos abandonados por otras aves, salientes en acantilados, depresiones en el suelo y techos de edificios altos. La hembra deposita tres o cuatro huevos pálidos con pintas pardas que ambos empollan durante unos 30 días.

Se distingue por la cabeza, espalda, alas y cola de color gris oscuro. Detrás del pico hay una amplia banda oscura o bigote. La garganta y el pecho son blancos, mientras que el abdomen y las patas tienen estrías horizontales. Los dos sexos son similares. Los jóvenes son pardo oscuro por arriba. Por ser uno de los depredadores aéreos más veloces y ágiles, ha sido muy utilizado en el deporte de la cetrería para cazar palomas y otras aves.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora acechando Palomas Turcas y sobrevolando espacios abiertos del campus. Foto por Gloria Archilla.

Jilguero (*Chlorophonia musica*)

El Jilguero (*Antillean Euphonia*) reside todo el año en Puerto Rico. Mide unas 4.8 pulgadas. Habita en la Española, Puerto Rico y las Antillas Menores hasta Granada. Se encuentra en bosques húmedos y secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Vuela en bandadas pequeñas y se alimenta mayormente de las frutas del muérdago (Phoradendron sp.), contribuyendo a la propagación de esta planta parásita. Se reproduce de enero a julio. Construyen un nido en forma de domo entre bromelias y camuflado con líquenes. La hembra pone tres o cuatro huevos blancos con pequeñas pintas pardas.

El macho tiene la garganta, pecho, vientre, flancos y espalda baja de color amarillo brillante, la frente anaranjada, y la cabeza azul turquesa. La espalda, mejillas, alas y cola son azul añil o negro. La hembra tiene la espalda y las mejillas verde oliva, la garganta, pecho, vientre y flancos amarillentos, la cabeza azul pálido, y la frente y espalda baja amarillas. El pico es corto y negro, las patas son gris.

En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque. Se han visto nidos detrás de la residencia del rector y en una franja de bosque en la Finca Alzamora. Foto por Luis Nieves.

Golondrina de Cuevas (*Protochelidon fulva*)

La Golondrina de Cuevas (*Cave Swallow*) reside todo el año en Puerto Rico. Habita desde Texas hasta Perú y en las Antillas Mayores. Mide unas 5 pulgadas. Vuela sola o en bandadas, alimentándose de moscas, abejas, libélulas, escarabajos y otros insectos que captura al vuelo, a menudo en áreas urbanas. Anida de abril a junio en colonias en la penumbra de cuevas (que en algunos pueblos se conocen cuevas de las golondrinas), sumideros, debajo de puentes, en edificios viejos y debajo de los aleros de algunas casas. Los nidos son en forma de tazón (bowl) y se construyen de fango (con algunas hierbas secas) que las aves transportan bocado a bocado desde las orillas de charcas y ríos hasta el lugar de anidamiento. El mismo nido puede ser usado en años sucesivos. La hembra pone tres o cuatro huevos blancos, con pintas oscuras, que ella misma empolla. Ésta es la especie de golondrina más abundante en la Isla.

Se distingue por el plumaje dorsal azul negruzco con la frente, el cuello y la base del rabo pardo-anaranjado. La cabeza tiene una franja negra que recuerda una máscara. El plumaje ventral es gris pálido. Las patas son cortas, la punta del rabo es cuadrada y el pico es corto. Los dos sexos son similares.

En la universidad se observa cazando insectos mientras vuela sobre patios y espacios abiertos. Foto por Rafael Rodríguez.

Golondrina de Iglesias (*Progne dominicensis*)

La Golondrina de Iglesias (*Caribbean Martin*) reside en Puerto Rico desde enero hasta agosto y pasa el resto del año en Sudamérica. Abunda más en áreas urbanas, particularmente cerca del centro de las ciudades. Habita en las Antillas Mayores (con la excepción de Cuba) y a través de las Antillas Menores. Mide unas 7 pulgadas (el macho es más grande). Se alimenta de moscas, abejas, libélulas, escarabajos y otros insectos que captura al vuelo, posándose el resto del tiempo mayormente sobre los cables del tendido eléctrico. Anida generalmente en grupos pequeños durante los meses de abril y mayo. Los nidos se construyen de materiales blandos, tales como yerba seca, hojas, papel y fibras de algodón dentro de una variedad de cavidades que incluyen nidos viejos de carpinteros, huecos en árboles, aleros de casas, fachadas de casas alcaldías, campanarios de iglesias y hasta semáforos. La hembra pone de cuatro a seis huevos blancos que se empollan por unos quince días.

El macho es azul violeta metálico con el vientre blanco. La hembra y los jóvenes tienen la espalda más pálida y la garganta y los lados del cuerpo son pardo-grisáceos. Las patas son cortas y el rabo tiene una característica forma de horquilla. El pico es corto.

En la universidad se observa cazando insectos mientras vuela sobre patios y espacios abiertos. Foto por Jonathan Morel.

Bolsero de Baltimore (*Icterus galbula*)

El Bolsero de Baltimore (*Baltimore Oriole*) es un visitante poco frecuente entre septiembre y mayo. Anida desde el sureste de Canadá hasta el norte de Alabama y Georgia. Inverna en la Florida, México, Centroamérica, las Antillas y el norte de Sudamérica. Mide unas 8 pulgadas. Habita principalmente en bordes de zonas forestales y terrenos agrícolas. Explora la vegetación en búsqueda de insectos y arañas, aunque también consume caracoles, frutas y néctar. Puede atraerse con frutas maduras, comederos y botellas con néctar para zumbadores. En Norteamérica construyen entre mayo y junio un nido colgante en forma de canasta que fijan a las ramas de un árbol. La hembra pone de cuatro a seis huevos blancos con manchas pardas y los empolla por unos 14 días.

El macho tiene plumas negras en la cabeza, garganta, nuca y mejillas, formando una capucha. El pecho, vientre, flancos y base de la cola son anaranjados. La hembra no tiene la capucha negra y el anaranjado de su cuerpo es más pálido, mientras que su espalda, alas y cola son pardo pálido. Las alas de ambos sexos tienen barras blancas. El pico y las patas son de color gris.

En la universidad se ha observado una sola vez: un macho en la primavera de 2009, en una franja de bosque de la Finca Alzamora. Foto por Dominik Hofer.

Calandria (*Icterus portoricensis*)

La Calandria (*Puerto Rican Oriole*) es autóctona o única de Puerto Rico. Es común aunque algunas poblaciones han sido severamente parasitadas por el Tordo Lustroso. Mide unas 8.5 pulgadas. Habita en bosques húmedos y secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, manglares, palmares, y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Escudriña la vegetación en búsqueda de insectos, aunque ocasionalmente consume arañas, escorpiones, lagartijos, coquíes, néctar, flores y frutas. Anida mayormente de marzo a junio. La hembra construye un nido colgante en forma de canasta que fija a hojas de palmas y matas de guineo y plátano. Allí pone tres o cuatro huevos blancuzcos o pardo-azulosos que ella misma empolla.

Se distingue por el plumaje negro, con áreas amarillas en los hombros, la base de la cola y los muslos de las patas. Algunos individuos tienen más color amarillo. El pico es negro y las patas son grises. Los jóvenes son mayormente verde oliva, con el pecho y vientre pálidos, y la garganta negruzca o pardo-rojiza.

En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque. Anida en las hileras de palmas que flanquean calles y avenidas, y en palmas sembradas en patios y jardines. También anida en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Gloria Archilla.

Mozambique (*Quiscalus niger*)

El Mozambique o Chango (*Greater Antillean Grackle*) reside todo el año en Puerto Rico. Habita a través de las Antillas Mayores y mide hasta 1 pie de largo. Se alimenta de néctar, frutas, caracoles, garrapatas, insectos, coquíes, lagartijos y hasta pichones de otras aves. En áreas urbanas come desperdicios alrededor de casas y establecimientos de comida rápida. Pasan la noche en árboles o en estaciones eléctricas donde se concentran en grandes y ruidosas bandadas. Anidan mayormente de abril a agosto en grupos pequeños que se congregan en árboles y palmas. El macho corteja a la hembra desplegando y vibrando las alas y el plumaje. La hembra construye un nido en forma de copa donde deposita de tres a cinco huevos azulosos con manchas rojizas o negras. El grupo defiende los nidos volando hacia el intruso y emitiendo un chirrido agudo.

Se distingue por el cuerpo negro con brillantes ojos amarillos y la larga cola en forma de V. El pico es largo y fino. El macho es más grande y lustroso que la hembra y tiene la V del rabo más pronunciada.

En la universidad se observa en casi todos los lugares, especialmente en espacios abiertos cerca de los edificios y del Centro de Estudiantes. Anida en las palmas del recinto, especialmente en las palmas reales. Foto por José Almodóvar.

Tordo lustroso (*Molothrus bonariensis*)

El Tordo Lustroso (*Shiny Cowbird*) reside todo el año en Puerto Rico. Es nativo de Sudamérica y ha subido por las Antillas Menores, volando de isla en isla hasta llegar a Cuba, el sur de la Florida y la península de Yucatán. Se estableció en Puerto Rico a mediados del siglo pasado. Mide unas 7.5 pulgadas (el macho es un poco más grande). Frecuenta áreas boscosas abiertas, campos, vaquerías, matorrales, jardines y patios. Vuela en bandadas, a veces en compañía de mozambiques, buscando semillas e insectos. Es fácil de atraer a comederos artificiales. Por la noche duerme en bandadas que se agrupan en árboles y estaciones de energía eléctrica. No anida, sino que pone sus huevos, uno por nido, en nidos de otras aves que les crían los polluelos. Los huevos del tordo se desarrollan rápido y sus polluelos nacen antes de los del hospedero, recibiendo por lo tanto trato preferencial. Este parasitismo ha afectado las poblaciones de la Mariquita y otras aves nativas.

El macho es negro-violeta brillante, mientras que la hembra es parda, con el vientre más pálido. Ambos tienen el pico cónico y el rabo largo. Los machos jóvenes tienen la coloración de la hembra.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Foto por Ricardo Moller.

Turpial (*Icterus icterus*)

El Turpial (*Troupial*) reside todo el año en Puerto Rico. Fue introducido al Caribe hace más de dos siglos, probablemente como ave ornamental, y se ha dispersado naturalmente a islas cercanas. Es nativo de la cuenca del Río Amazonas y habita en la mitad norte de Sudamérica. Mide cerca de 10 pulgadas. Vive en bosques, sabanas secas y urbanizaciones con arboledas. Vuela en parejas o grupos pequeños en búsqueda de frutas, siendo la de la palma real una de sus favoritas. En las zonas secas del sur se alimenta a menudo de las frutas del sebucán, una especie de cactus. Durante la época reproductiva aumenta el consumo de insectos, huevos y pichones de otras aves. Anida mayormente de marzo a junio. Construyen un nido en forma de copa grande o tazón profundo sobre cactos, arbustos espinosos y árboles. La hembra pone tres o cuatro huevos blanco-purpúreos que se empollan durante unos 15 días.

Se distingue por su plumaje anaranjado, con la cabeza, el pecho y el rabo negro. También tiene una mancha blanca grande en el ala y un triángulo azul-verdoso en la base del pico y detrás del ojo. Los dos sexos son parecidos. Los jóvenes son amarillentos.

En la universidad se observa en arboledas, patios y espacios abiertos. Foto por Olivier Vimont.

Ruiseñor (*Mimus polyglottos*)

El Ruiseñor (*Northern Mockingbird*) reside todo el año en Puerto Rico. Habita desde el sur de Canadá hasta México y a través de las Antillas Mayores. Mide hasta 1 pie. Abunda en bordes de arboledas, llanos costeros, fincas, jardines y patios. Se alimenta mayormente de frutas pero también consume insectos y arañas. La pareja construye sobre un arbusto un nido en forma de copa donde depositan de dos a cuatro huevos verdosos con pintas rojizas, que solo la hembra empolla. La pareja defiende agresivamente los alrededores del nido contra cualquier ave, animal o incluso persona que se acerque. Los ruiseñores de territorios adyacentes pueden unirse al ataque. Su nombre científico deriva de la variedad de voces que puede emitir. No sólo tiene un repertorio amplio, sino que a veces imita otras aves, animales y sonidos cotidianos tales como bocinas y alarmas de automóviles.

Se distingue por el color dorsal gris oscuro, el plumaje ventral gris pálido o blanco, el rabo largo y la presencia de una mancha blanca en cada ala que se nota claramente cuando vuela. El pico y las patas son grises. Los dos sexos son similares, los jóvenes tienen el pecho y el vientre manchados.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Se ha observado anidando en arbustos de cruz de malta. Foto por Lucas Limonta.

Zorzal Pardo (*Margarops fuscatus*)

El Zorzal Pardo (*Pearly-eyed Thrasher*) reside todo el año en Puerto Rico. Habita en las Bahamas, la punta sureste de la República Dominicana, Puerto Rico y a través de las Antillas Menores. Mide cerca de 1 pie. Abunda en bosques, cafetales, arboledas, palmares, jardines y patios. Se alimenta de frutas, insectos, coquíes, lagartijos, huevos y pichones de otras aves. Su hábito de depredar huevos y pichones la convierte en un enemigo importante de varias especies, incluyendo a la cotorra puertorriqueña. Anida durante casi todo el año. La pareja construye en el hueco de un árbol un nido de palitos, hierbas y raíces, donde la hembra deposita de dos a cuatro huevos azules.

Se distingue por el plumaje dorsal pardo, el plumaje ventral blanco con estrías pardas, el rabo largo, y los ojos blancos que contrastan singularmente con la cabeza oscura. El pico y las patas son pardas. Los dos sexos son similares. Aunque se le llama zorzal, está más estrechamente relacionado con el Ruiseñor que con el Zorzal Patirrojo.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en arboledas, franjas de bosque y espacios abiertos. Anida en nidos artificiales (*nest boxes*), en sistemas de ventilación y cerca de acondicionadores de aire. Foto por Alejandro Sánchez.

Candelita (*Setophaga ruticilla*)

La Candelita (*American Redstart*) nos visita mayormente de septiembre a abril. Es una de las reinitas migratorias más abundantes en la Isla. Anida en los bosques de Canadá y del norte y este de los Estados Unidos. Inverna en el sur de la Florida, las Antillas, y desde las zonas bajas de México a través de Centroamérica hasta el norte de Brasil y Perú. Mide unas 5 pulgadas. En Puerto Rico habita en bosques, cafetales de sombra, manglares y jardines de áreas urbanas. Tiene el hábito de menear las alas y abrir y cerrar la cola mientras salta de rama en rama en búsqueda de insectos y arañas. También consume algunas frutas. El macho, particularmente, defiende agresivamente su territorio de alimentación. En Norteamérica la hembra construye un nido en forma de copa donde deposita de uno a cinco huevos blancos con pintas pardas que son empollados durante unos 12 días.

El macho se distingue por el color negro con manchas anaranjadas en los costados, las alas y la cola. La hembra y los jóvenes son grisáceos por arriba, blancos por debajo y sus manchas son amarillas.

En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque, como en la Finca Alzamora, en el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Gerrit Vyn.

Pizpita de Río (*Parkesia motacilla*)

La Pizpita de Río (*Louisiana Waterthrush*) nos visita desde agosto hasta abril, por lo que curiosamente pasa más tiempo aquí que en su territorio de anidamiento. Anida en la mitad este de Norteamérica e inverna en la Florida, Centroamérica, las Antillas y el norte de Sudamérica. Mide unas 6 pulgadas. Camina meneando constantemente la cola hacia arriba y hacia abajo en busca de insectos y ocasionalmente caracolitos y crustáceos pequeños en las orillas de ríos, quebradas, charcas o pantanos de agua dulce, y también en los bosques húmedos de nuestras montañas. Durante el periodo migratorio establece un territorio de unos 100 a 300 metros lineales a lo largo de un río o quebrada. En Norteamérica, la pareja construye un nido de ramitas, hierbas y musgo entre raíces de árboles caídos o en huecos entre rocas cerca de un arroyo en el bosque. La hembra deposita unos cinco huevos que ella misma empolla por cerca de 13 días.

Se distingue por el plumaje marrón oscuro en las alas, espalda, cabeza y cola, la línea blanca sobre los ojos, y el pecho y vientre blancos con estrías marrón oscuro. Las patas son rosadas y el pico es oscuro, agudo y recto. Los dos sexos son parecidos.

En la universidad se observa en las orillas de la Quebrada de Oro. Foto por Garth McElroy.

Reinita Azul (*Setophaga caerulescens*)

La Reinita Azul (*Black-throated Blue Warbler*) nos visita de septiembre a mayo. Anida mayormente en el este de los Estados Unidos, desde los Grandes Lagos hasta la costa y hacia el sur hasta las Montañas Apalaches. Inverna principalmente en las Antillas Mayores. Mide unas 5 pulgadas. En Puerto Rico habita dentro y en los alrededores de bosques húmedos, tanto en la montaña como en áreas bajas. También visita cafetales en sombra, bosques secos y jardines. Los dos sexos establecen y defienden un territorio en el que se alimentan de insectos, arañas y frutas. En Norteamérica, la hembra construye un nido en forma de copa a baja altura en una horqueta entre los arbustos espesos del bosque y deposita de dos a cinco huevos que ella misma empolla durante unos 13 días.

El macho es azul con el vientre blanco; la cara, la garganta y los flancos son negros. La hembra es verde oliva o grisácea, con arcos blancos alrededor de los ojos. Ambos tienen una pequeña mancha blanca en el ala. El pico es ancho, puntiagudo y negro.

En la universidad se observa en franjas de bosque de la Finca Alzamora, detrás del complejo de Ingeniería Civil e Ingeniería Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Michael Hogan.

Reinita Galana (*Setophaga discolor*)

La Reinita Galana (*Prairie Warbler*) nos visita mayormente de agosto a abril. Anida en el sur de Ontario (Canadá) y en la mitad este de los Estados Unidos e inverna mayormente en la Florida y las Antillas Mayores. Mide poco más de 4 pulgadas. En Puerto Rico habita en bordes de bosques húmedos y secos, cafetales, malezas, orillas de caminos, manglares y jardines. Por lo general forrajea sola en búsqueda de insectos y arañas, aunque también consume algún néctar y frutas. A menudo cuando se posa mueve la cola hacia arriba y hacia abajo. En Norteamérica, la hembra construye un nido en forma de copa en un arbusto o árbol joven y deposita de tres a cinco huevos blancos con pintas pardas, que ella misma empolla durante unos 13 días.

Se distingue por su espalda verde-oliva amarillenta, con la garganta, pecho y vientre amarillos. Hay una franja amarilla sobre el ojo, otra debajo y una línea oscura que lo cruza. Los lados del pecho tienen dos franjas negras. El pico es pardo oscuro, corto y puntiagudo. Las patas son negras. La hembra se parece al macho pero sus colores son menos intensos.

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Gloria Archilla.

Reinita Gargantiamarilla (*Setophaga dominica*)

La Reinita Gargantiamarilla (*Yellow-throated Warbler*) nos visita mayormente de septiembre a abril. Anida en los bosques del este y sureste de los Estados Unidos e inverna desde la costa de Carolina del Sur hasta Nicaragua y a través de las Antillas hasta Guadalupe. Mide hasta 6 pulgadas. En Puerto Rico habita mayormente en palmares, matorrales y manglares. Se alimenta de insectos y arañas que encuentra husmeando entre y sobre las hojas con su pico, que es proporcionalmente más largo que el de otras reinitas. También ingiere néctar y algunas frutas. En los Estados Unidos, la hembra construye un nido en forma de copa, bien alto en el bosque y deposita de tres a cinco huevos que ella misma empolla durante unos 13 días. El macho permanece cerca cantando y defendiendo el territorio.

Se distingue por su espalda gris, garganta amarilla y vientre blanco. La cabeza tiene manchas blancas y negras, y el costado tiene líneas negras sobre el fondo blanco. Las alas tienen dos franjas blancas. El pico es negro y puntiagudo. La hembra se parece al macho pero sus colores son menos intensos.

En la universidad se ha observado una vez, en la hilera de árboles de maría y kamani que sube hacia el Natatorio. Foto por Steven Joscelyn.

Reinita Pechidorada (*Setophaga americana*)

La Reinita Pechidorada (*Northern Parula*) nos visita mayormente de agosto a mayo, siendo una de las reinitas migratorias más comunes. Anida en bosques desde el sureste de Canadá y la región de los Grandes Lagos hasta Texas y la Florida. Inverna mayormente en el sur de la Florida y las Antillas. Mide unas 4.5 pulgadas. En Puerto Rico visita una gran variedad de hábitats, incluyendo bosques, cafetales de sombra, fincas abandonadas, matorrales, manglares y jardines. Por lo general forrajea sola en búsqueda de insectos y arañas. En Norteamérica, la hembra construye un nido en forma de copa entre masas de líquenes o musgo español y deposita de tres a cinco huevos que ella misma empolla durante unos 13 días.

Se distingue por el plumaje azul grisáceo, garganta y pecho amarillos, y vientre blancuzco. Los ojos tienen un anillo blanco interrumpido y las alas tienen dos franjas blancas. El macho tiene una franja anaranjada o negruzca en el pecho, la hembra no tiene esta banda y sus colores son más apagados.

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Gloria Archilla.

Reinita Tigre (*Setophaga tigrina*)

La Reinita Tigre (*Cape May Warbler*) nos visita mayormente de octubre a abril. Anida en los bosques de Canadá y el noreste de los Estados Unidos e inverna en las Antillas Mayores. Mide unas 5 pulgadas. En Puerto Rico habita en bosques húmedos, cafetales de sombra, matorrales, manglares, parques y jardines. Se alimenta de insectos, arañas, frutas y néctar que su lengua casi cilíndrica le permite obtener con mayor eficiencia que otras reinitas. Los dos sexos son agresivos y defienden activamente los ramilletes de flores ricas en néctar. En Norteamérica se alimenta principalmente de una alevilla que causa gran daño a los abetos (*spruce*). La hembra construye un nido en forma de copa en lo alto de un abeto y deposita de cuatro a nueve huevos.

Se distingue por el pecho y vientre amarillos con líneas negras. El cuello es amarillo intenso, una franja oscura cruza los ojos y la mejilla tiene una mancha rojiza. Las alas tienen una mancha blanca. El pico es negro y cilíndrico, las patas son negras. La hembra se parece al macho pero la mejilla no es rojiza y sus colores son menos intensos.

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Eladio Fernández.

Reinita Trepadora (*Mniotilta varia*)

La Reinita Trepadora (*Black-and-white Warbler*) nos visita mayormente de septiembre a abril. Anida en los bosques de Canadá y del norte y este de los Estados Unidos. Inverna en el sur de la Florida, las Antillas, y desde México hasta el noroeste de Sudamérica. Mide unas 5 pulgadas (los machos son un poco más grandes). En Puerto Rico habita en bosques, cafetales de sombra, manglares y jardines con árboles. Vuela hasta la base de un tronco y usa sus dedos largos con garras largas y afiladas para trepar en búsqueda de insectos y arañas. Ambos sexos establecen y defienden territorios de alimentación a los cuales regresan en años sucesivos. En Norteamérica, la hembra construye un nido en forma de copa escondido entre la hojarasca cerca de la base de un tronco y deposita de cuatro a seis huevos blancos, con pintas pardas, que ella sola empolla por unos 11 días.

Se distingue por el patrón de franjas blancas y negras que cubre el cuerpo. El macho tiene las mejillas negras y el estriado del vientre es más pronunciado. El pico y las patas son negras.

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por A. J. Hand.

Gorrión Doméstico (*Passer domesticus*)

El Gorrión Doméstico o Gorrión Inglés (*House Sparrow*) reside todo el año en Puerto Rico. Es una especie de Europa, Asia y el norte de África que ha sido llevada por el hombre alrededor del mundo y habita en las ciudades y sus alrededores. En Puerto Rico se estableció en la década del 1970. Mide unas 6 pulgadas (el macho es más grande). Vuela en bandadas pequeñas buscando semillas, frutas, insectos, alimento de animales domésticos, migajas de pan y desperdicios caseros. Se alimenta por lo general en el suelo y se desplaza dando saltitos. Ocasionalmente se revuelca en la tierra para despojarse de parásitos. Anida mayormente de mayo a septiembre en huecos, postes, tubos y otras cavidades que la pareja tapiza con hojas secas, plumas y pedazos de papel. La hembra deposita de cuatro a seis huevos blancuzcos con machas oscuras que ambos incuban por unos doce días.

Los machos tienen el área alrededor de los ojos y la garganta negros, el dorso de la cabeza y las mejillas gris, y los lados de la cabeza pardos. El plumaje dorsal es marrón y negro, y el plumaje ventral es gris claro. La hembra es parda con manchas negras en las alas. El pico es cónico y corto, el rabo es corto.

En la universidad se observa alrededor de edificios, en espacios abiertos y en patios. Foto por A. Wilson.

Carpintero de Puerto Rico (*Melanerpes portoricensis*)

El Carpintero de Puerto Rico (*Puerto Rican Woodpecker*) es autóctono o único de Puerto Rico. Es común y abundante en toda la isla. Mide hasta 10 pulgadas (el macho es más grande). Habita en bosques húmedos y secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, manglares y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Excava con el pico bajo la corteza de tallos y ramas para remover insectos con su lengua larga y pegajosa. También come frutas, moluscos, lombrices, arañas, escorpiones, lagartijos y coquíes. Cuando se detiene sobre un tronco o rama vertical usa las plumas duras de su cola para descansar el peso contra el árbol. El macho golpea con su robusto pico muy rápido sobre un tronco o rama hueca para anunciar y delinear su territorio. De enero a abril, el macho excava una cavidad en un árbol, palma, o poste del tendido eléctrico, donde la hembra pone de 4 a 6 huevos blancos que ambos incuban.

Se distingue por las plumas dorsales negras, garganta y pecho rojos, vientre y flancos pardos, y frente de la cabeza y base del rabo blancos. El pico de la hembra es más corto y su garganta y pecho tienen menos rojo.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en postes del tendido eléctrico, en áreas de bosque en la Finca Alzamora, detrás del edificio de Biología, y en los alrededores del edificio de Rectoría. Foto por Gloria Archilla.

Cotorra Cabeciblanca (*Amazona albifrons*)

La Cotorra Cabeciblanca (*White-fronted Parrot*) reside todo el año en Mayagüez. Fue introducida por el mercado de mascotas y se ha establecido en las inmediaciones del recinto, donde habitan unos veinte individuos que se desplazan en bandadas hacia arboledas al norte y oeste de la ciudad en busca de flores, frutas y semillas. Habita desde el sur de México hasta Costa Rica. Mide unas 10 pulgadas. Anida de febrero a julio en cavidades de árboles y palmas, y en nidos artificiales (*nest boxes*). La hembra pone tres huevos blancos que ella sola empolla durante unos 30 días.

Se distingue por el plumaje verde, con la frente blanca, una mancha azul en el tope de la cabeza y una mancha roja que cruza frente al pico y rodea los ojos. La piel que bordea el ojo es gris. El pico es amarillo. El borde anterior de las alas es rojo en el macho y verde en la hembra. Aunque esta cotorra no se distingue por su habilidad para vocalizar, algunos individuos han desarrollado amplios vocabularios.

En la universidad se observa (y se escucha) temprano por la mañana en los árboles cercanos al edificio Monzón y más tarde en lo alto de árboles, postes y cables del tendido eléctrico en otros lugares del recinto. Foto por Ricardo Tames.

Periquito Aliblanco (*Brotogeris versicolurus*)

El Periquito Aliblanco o Periquito Aliamarillo (*White-winged Parakeet*) reside todo el año en Puerto Rico. Fue introducido desde Venezuela para el mercado de mascotas y se ha propagado hasta convertirse en el psitácido más abundante en la Isla. Es nativo del norte de Sudamérica y mide unas 10 pulgadas. Forma bandadas grandes que vuelan distancias considerables a fincas, jardines, patios y zonas urbanas en búsqueda de frutas y semillas. Al atardecer se posan en grandes cantidades en un árbol que les sirve de dormidero. Anidan de febrero a julio en nidos abandonados de comején, donde excavan un túnel que termina en una cámara en la cual ponen de cuatro a seis huevos.

Se distingue por el plumaje verde, con el borde del ala amarillo (lo que da origen a su segundo nombre común). Las plumas más largas del ala son azulosas. La cola es larga y fina. El pico es color marfil y las patas son amarillas. Cuando vuelan se nota claramente el triángulo blanco de plumas que da origen a su primer nombre común. Los dos sexos son similares.

En la universidad se observa en árboles a través del recinto. Se han observado anidando en colonias de comején en la Finca Alzamora y entre los edificios Chardón y el Centro de Estudiantes. Foto por Arthur Grosset.

Perico Monje (*Myiopsita monachus*)

El Perico Monje (*Monk Parakeet*) reside todo el año en Puerto Rico. Fue introducido durante la década del 1970 para el mercado de mascotas y se ha propagado a lo largo de la costa. Abunda más desde Manatí hasta Luquillo pero se ha observado en Aguadilla, Mayagüez y otros municipios. Es nativo de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero se ha naturalizado en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, España, Japón e Israel. Mide hasta 11 pulgadas (los machos son más grandes). Forma bandadas pequeñas que visitan fincas, parques y jardines en búsqueda de flores, semillas y frutas. No se ha precisado su temporada de reproducción en Puerto Rico. Los machos construyen, generalmente en una palma, un gran nido comunal con entradas y túneles que abren a cámaras individuales donde cada hembra pone de cinco a ocho huevos blancos que ella misma empolla por unos 24 días.

Se distingue por el plumaje mayormente verde con plumas gris en la cabeza, garganta, mejillas y pecho. El vientre es amarilloso. Las plumas del ala son azules. La cola es muy larga y puntiaguda. El pico es amarillo y las patas gris oscuro. Los dos sexos son similares.

En la universidad se observa y se escucha mayormente entre Enfermería y el Natatorio. Foto por Miguel Rouco.

Playero Coleador (*Actitis macularius*)

El Playero Coleador (*Spotted Sandpiper*) nos visita de agosto a abril. Es uno de los playeros más comunes durante el invierno. Anida en Norteamérica, desde Alaska hasta el área central de los Estados Unidos. Inverna desde el sur de los Estados Unidos hasta el centro de Argentina y a través de las Antillas. Mide unas 8 pulgadas (las hembras son más grandes). Camina agachado y meneando el cuerpo y la cola hacia arriba y hacia abajo por orillas de lodazales, salitrales, quebradas, ríos, manglares, lagunas, charcas, y playas en busca de crustáceos, insectos y peces. En Norteamérica, la pareja excava una depresión en el suelo forrada de hierba donde la hembra deposita de uno a cuatro huevos que ambos empollan por unos 21 días. A veces la mayor parte de la incubación le corresponde al macho porque las hembras pueden aparearse nuevamente y poner huevos en otro nido.

Muchos de los playeros que llegan a la Isla tienen el plumaje reproductivo de verano, compuesto de manchas negras sobre la espalda parda y el vientre blanco. El plumaje de invierno no tiene pecas. En ambos casos hay un anillo blanco alrededor de los ojos. Las patas son amarillas, el pico es largo y recto. Los dos sexos son parecidos.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto por Giff Beaton.

Playero Guineilla Mayor (*Tringa melanoleuca*)

El Playero Guineilla Mayor (*Greater Yellowlegs*) nos visita de agosto a abril. Anida en Alaska y Canadá e inverna desde el sur de los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego y en las Antillas. Es menos común que el Playero Guineilla Menor. Mide unas 13 pulgadas. Vadea junto a otros playeros en quebradas, ríos, charcas, lagunas salobres, manglares, pastizales inundados y lodazales en busca de insectos, lombrices, moluscos, cangrejos, renacuajos y peces. En ocasiones introduce el pico en el agua y lo mueve de lado al lado buscando contacto con animalitos. También corre distancias cortas acechando sus presas. En Norteamérica anida en una depresión poco profunda en el suelo de la tundra, escondida entre musgos y otra vegetación. La hembra deposita tres o cuatro huevos crema salpicados de pintas marrón oscuro que la pareja incuba por unos 23 días.

Se distingue por las largas patas amarillas, pico largo con una tenue curva hacia arriba, espalda parda o gris oscuro y vientre blanco. Cuando levanta vuelo llama la atención su cola blanca con barras horizontales oscuras. Los dos sexos son parecidos. Se distingue del Playero Guineilla Menor por su mayor tamaño y pico más largo. Antiguamente se cazaba para alimento.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto por Rafael Rodríguez.

Playero Guineilla Menor (*Tringa flavipes*)

El Playero Guineilla Menor (*Lesser Yellowlegs*) nos visita de agosto a abril. Anida en Alaska y Canadá e inverna desde el sur de los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego y en las Antillas. Es muy común durante el periodo invernal y siempre abunda más que el Playero Guineilla Mayor. Algunos individuos se quedan en la isla durante el verano. Mide unas 10 pulgadas. Vadea junto a otros playeros en quebradas, ríos, charcas, lagunas salobres, manglares, pastizales inundados y lodazales en busca de insectos, lombrices, moluscos, cangrejos, renacuajos y peces. En ocasiones introduce el pico en el agua y lo mueve de lado al lado buscando contacto con animalitos. También corre distancias cortas asechando sus presas. En Norteamérica anida en una depresión poco profunda en el suelo de la tundra, lejos del agua. La hembra deposita tres o cuatro huevos crema salpicados de pintas marrón oscuro que la pareja incuba por unos 23 días.

Se distingue por las largas patas amarillas, pico largo, espalda parda o gris oscuro y vientre blanco. Cuando levanta vuelo se distingue su cola blanca con barras horizontales oscuras. Los dos sexos son parecidos. Se distingue del Playero Guineilla Mayor por su menor tamaño y pico más corto.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro y en predios de grama inundados por la lluvia. Foto por José Almodóvar.

Playero Solitario (*Tringa solitaria*)

El Playero Solitario (*Solitary Sandpiper*) nos visita en septiembre y octubre. Algunos permanecen en la isla, pero la mayoría parte hacia Sudamérica y se detienen aquí nuevamente cuando regresan a su territorio de anidamiento en Alaska y Canadá. Vuela solo o en bandadas muy pequeñas. Inverna desde el sur de los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego y en las Antillas. Mide unas 9 pulgadas. Camina solo, moviendo el cuerpo y la cola hacia arriba y hacia abajo, por las orillas de charcas, lodazales, quebradas, ríos, zanjas, pastizales y cañaverales inundados. Se alimenta de insectos, lombrices, caracolitos y otros invertebrados que encuentra cerca de la superficie del agua. A veces permanece quieto por largos periodos en espera de que se le acerquen presas y otras veces revuelve el agua con una pata para asustarlas. En Norteamérica acondiciona nidos viejos de otras aves, una costumbre inusual para los playeros. La hembra deposita cuatro huevos que la pareja empolla por unos 24 días.

Se distingue por el plumaje pardo oscuro con muchos puntitos blancos en las alas, vientre blanco, anillo blanco alrededor de los ojos y patas verdosas. Tiene el pico recto, oscuro y delgado. Los dos sexos son parecidos. Cuando aterriza permanece un rato con las alas apuntando hacia arriba, como haciendo balance.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto por Rafael Rodríguez.

Múcaro Común (*Megascops nudipes*)

El Múcaro Común o Mucarito (*Puerto Rican Screech-Owl*) es autóctono o único de Puerto Rico. Mide unas 10 pulgadas (la hembra es más grande). Es el búho más abundante y ampliamente distribuido, encontrándose en bosques y cerca de áreas urbanas. Canta activamente al amanecer y al atardecer. Ubica sus presas asistido por el sentido de la audición: las plumas del rostro forman un disco facial que recoge y canaliza los sonidos hacia los oídos. Se alimenta mayormente de insectos grandes pero también captura escorpiones, coquíes, lagartijos, aves y ratones. Se traga las presas enteras, excepto por las aves, que despluma e ingiere en pedazos grandes. Regurgita el material indigerible (piel, pelo y hueso) en una masa compacta. De abril a junio pone uno o dos huevos blancos, mayormente en huecos de árboles.

Se distingue por el plumaje pardo oscuro que cubre casi toda la espalda y por las cejas blancas. El pecho y el abdomen son blancos con barras pardo oscuro. Los dos sexos son parecidos. Los jóvenes tienen el cuerpo cubierto de abundantes plumones o plúmulas.

En la universidad se observa de noche en la periferia de arboledas y franjas de bosque. En el 2007 se encontró un nido detrás del edificio de Biología. Foto por Michael Morel.

Reina Mora (*Spindalis portoricensis*)

La Reina Mora (*Puerto Rican Spindalis*) es autóctona o única de Puerto Rico. Mide unas 7 pulgadas (el macho es más grande). Es común en bosques, cafetales, solares baldíos, parques, jardines y áreas urbanas donde se alimenta de néctar, una gran diversidad de frutas e insectos. Vuela distancias considerables en busca de alimento y por lo tanto tiene un importante papel dispersando árboles silvestres y otras plantas. El macho es agresivo y pelea con su propia imagen en cristales de casas y espejos retrovisores de automóviles, dejando a menudo el área manchada de excremento. Anida mayormente de abril a junio. La pareja construye un nido en forma de copa donde la hembra deposita de dos a cinco huevos azulosos, con manchas pardas, que ambos empollan.

El macho tiene la cabeza negra con franjas blancas sobre los ojos y detrás del pico, el collar anaranjado, el pecho amarillo-verdoso y el vientre gris. La hembra es verde-oliva menos intenso, con tenues bandas blancas encima del ojo y detrás del pico.

En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Anida en árboles en distintos lugares del recinto. Foto por Mark Oberle.

Reinita Común (*Coereba flaveola*)

La Reinita Común (*Bananaquit*) reside todo el año en Puerto Rico y es el ave más común de la Isla. Vive en todas las islas de Caribe (menos Cuba) y desde México hasta Argentina. Mide unas 4 pulgadas. Es común en todos los ambientes donde hay árboles, arbustos y flores. Se alimenta de néctar (que a veces extrae a través de una cortadura en la base de la flor), frutas, arañas e insectos. Es fácil de atraer a comederos con azúcar. Se reproduce todo el año. La pareja construye un nido globular que puede incluir ramitas, algodón, corteza e hilachas, usando a menudo material de nidos viejos. La hembra deposita en el fondo del nido dos o tres huevos con manchas pardas que sólo ella empolla. Las reinitas construyen además otros nidos para pasar la noche.

Se distingue por su cabeza negra con una amplia franja blanca sobre los ojos, espalda negra, garganta gris, vientre amarillo y una mancha blanca en las alas. El pico es corto, negro y curvo; las patas son grises. Los dos sexos son parecidos. Es un ave muy activa que rara vez se posa quieta por mucho tiempo.

En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Frecuenta patios y jardines en áreas aledañas al campus. Anida en árboles y arbustos a través del recinto. Foto por Rafael Rodríguez.

San Pedrito (*Todus mexicanus*)

El San Pedrito (*Puerto Rican Tody*) es autóctono o único de Puerto Rico. Mide poco más de 4 pulgadas. Habita en bosques húmedos y secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, manglares y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Se posa quieto en una rama hasta que observa una presa y vuela hasta el lugar para capturarla. Se alimenta mayormente de insectos, pero también come arañas, lagartijos pequeños y algunas frutas. Anida entre febrero y mayo. La pareja excava en un talud un túnel de aproximadamente un pie de largo que termina en una cámara, donde la hembra pone de dos a cuatro huevos blancos que ambos empollan por unas tres semanas. La proximidad de un San Pedrito se advierte cuando emite su característico canto (un bip-bip parecido al de un grillo) y luego cuando vuela distancias cortas entre las ramas.

Se distingue por el cuerpo verde esmeralda con el pecho y vientre blanco, garganta roja y flancos amarillos. El pico es recto, ancho y largo para el tamaño diminuto del ave. Los ojos son grises en el macho y blancos en la hembra. La cola muy corta y alas anchas permiten el vuelo ágil entre la vegetación tupida.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, cerca del complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Anida en los taludes presentes en estos lugares. Foto por Antonio Iñigo.

Zumbadorcito de Puerto Rico (*Riccordia maugaeus*)

El Zumbadorcito de Puerto Rico (*Puerto Rican Emerald*) es autóctono o único de Puerto Rico. Mide hasta 4 pulgadas. Habita en bosques húmedos y secos, cafetales bajo sombra, bosques secundarios, manglares y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. En el este de la Isla ha sido mayormente desplazado por el Zumbadorcito Crestado. Se alimenta de insectos, arañas y néctar. Defiende de otros zumbadores y de la Reinita Común los parchos de flores ricas en néctar. Chupa el néctar introduciendo su pico a través de la flor o insertándolo por perforaciones que otras aves hacen en la base de la flor. Anida mayormente de febrero a mayo. La hembra construye en una rama u horqueta un pequeño nido en forma de taza, adornado con líquenes y amarrado con hebras de tela de araña. Pone dos huevos blancos diminutos que sólo ella empolla.

El macho es verde por arriba y por debajo, con el rabo negro azuloso y ahorquillado (bifurcado). La base de la mandíbula inferior es rojiza. La hembra tiene la garganta, pecho y vientre blancos, con la base de la mandíbula inferior negra. El pico es negro, relativamente corto y recto.

En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque y espacios abiertos. Anida en arbustos y árboles en jardines y franjas de bosque, particularmente en la Finca Alzamora y detrás del edificio de Biología. Foto por Rafael Rodríguez.

Zumbador Dorado (*Anthracothorax aurulentus*)

El Zumbador Dorado (*Antillean Mango*) reside todo el año en Puerto Rico. Habita en la Española, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Mide hasta 5 pulgadas. Habita en la periferia de los bosques, en los llanos costeros y cerca de zonas urbanas. Se alimenta de insectos, arañas y néctar que chupa introduciendo su pico y lengua larga a través de la flor. Defiende su territorio agresivamente de otros zumbadores y de aves grandes. Anida mayormente de marzo a agosto. La hembra construye en una rama u horqueta un nido en forma de taza, adornado con líquenes y amarrado con hebras de tela de araña. Pone dos huevos blancos diminutos que sólo ella empolla durante unos quince días.

El macho es verde dorsalmente con la garganta verde iridiscente, el pecho negro y el vientre grisáceo. El rabo es púrpura iridiscente y no está ahorquillado (bifurcado). La hembra es verde dorsalmente y blanca ventralmente. El pico es negro y curvo. El color del cuerpo puede variar mucho dependiendo de la iluminación y el ángulo del sol.

En la universidad se observa en patios y espacios abiertos. Anida en arbustos y árboles en jardines y franjas de bosque, particularmente en la Finca Alzamora y detrás del edificio de Biología. Foto por Rafael Rodríguez.

Zorzal Patirrojo (*Turdus plumbeus*)

El Zorzal Patirrojo (*Red-legged Thrush*) reside todo el año en Puerto Rico. Habita en las Bahamas, las Antillas Mayores excepto Jamaica y en Dominica. Mide unas 10 pulgadas. Abunda en los bosques de la montaña, cafetales de sombra, bordes de carreteras, jardines y patios con árboles. Se alimenta mayormente de frutas, complementando la dieta con caracoles, insectos, arañas, coquíes y lagartijos que encuentra en la vegetación y entre la hojarasca. Está más activo temprano en la mañana y cerca del atardecer. Anida mayormente de enero a septiembre. La pareja construye un nido en forma de taza de ramitas, hierbas y hojas en una rama. La hembra pone tres o cuatro huevos verdosos con manchas pardas.

Se distingue por el pico, anillo ocular y patas coloradas que contrastan con el plumaje dorsal gris oscuro y ventral gris pálido. La garganta tiene estrías blancas y negras. Los dos sexos son similares. A pesar de su nombre, esta especie no está estrechamente relacionada con el Zorzal Pardo.

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Se ha observado anidando en un árbol cerca del Edificio Stefani. Foto por Alef Caste.

Bobito (*Contopus latirostris*)

El Bobito (*Lesser Antillean Pewee*) reside todo el año en Puerto Rico, aunque no se encuentra en el tercio este de la isla. Habita también en Guadalupe, Dominica, Martinica y Santa Lucía. Mide unas 6 pulgadas. Vive en bosques húmedos y secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, bordes de manglares y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Se alimenta casi exclusivamente de insectos que caza esperando en una rama bajo el dosel del bosque, cuando los localiza vuela para capturarlos en el aire o removerlos de una hoja o rama. Anida de marzo a junio. Construye un nido en forma de copita en una rama y empollan dos o tres huevos de color crema con manchas pardas.

Se distingue por el plumaje verde-oliva mezclado con pardo pálido en la cabeza, espalda, alas y cola. La garganta, el pecho, el vientre y los flancos son amarillentos. El pico es pardo oscuro arriba y amarillento abajo. Las patas son gris oscuro. Los dos sexos son parecidos. Los jóvenes tienen un plumaje más pálido. Su nombre común se debe a que es un ave mansa.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Lucas Limonta.

Clérigo (*Tyrannus caudifasciatus*)

El Clérigo (*Loggerhead Kingbird*) reside todo el año en Puerto Rico. Tiene una amplia distribución en la isla. Habita también en las Bahamas, las Islas Caimán, y las Antillas Mayores. Mide unas 10 pulgadas. Vive en bosques húmedos y secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, bordes de manglares y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Caza insectos removiéndolos de la superficie de la vegetación o lanzándose desde una rama o cable del tendido eléctrico para capturarlos en el aire. También come coquíes, lagartijos y frutas. Anida de noviembre a julio. Construye un nido en forma de plataforma o taza sobre una bromelia o en una horqueta de un árbol o arbusto, donde pone de dos a cuatro huevos de color pardo pálido con manchas pardo oscuras en el extremo ancho.

Se distingue por la cabeza negra, con la espalda, alas y cola pardo oscuro, mientras que la garganta, pecho, vientre y flancos son blancos. El pico es negro y las patas son gris oscuro. Los dos sexos son parecidos. Los jóvenes tienen un plumaje similar pero las partes negras son grisáceas y las partes blancas son crema.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Gloria Archilla.

Jui (*Myiarchus antillarum*)

El Jui (*Puerto Rican Flycatcher*) es autóctono o único de Puerto Rico, aunque a mediados del siglo pasado voló desde Vieques y Culebra para colonizar las Islas Vírgenes. Mide unas 8 pulgadas de largo. Habita en bosques húmedos y secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, bordes de manglares y franjas de bosques en suburbios. Su ancho pico y las plumas alargadas parecidas a pelos que tiene en la base facilitan la captura de insectos al vuelo. También come frutas, moluscos, coquíes y lagartijos. Anida de febrero a julio en la cavidad en un árbol, un nido excavado por un pájaro carpintero o un nido artificial. La hembra pone de tres a seis huevos amarillentos con pintas pardas que ambos adultos empollan.

Se distingue por la cabeza, espalda y cola de color pardo oscuro, con la garganta, pecho y vientre blancos o amarillentos. Las alas tienen barras pálidas, mientras que el pico y las patas son negros. Los dos sexos son similares. Su nombre deriva de su canto.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. En el 2005 una pareja anidó en un nido artificial (*nest box*) detrás del edificio de Biología. Foto por Lucas Limonta.

Pitirre (*Tyrannus dominicensis*)

El pitirre (*Gray Kingbird*) reside todo el año en Puerto Rico. Habita en el sur de los Estados Unidos, a través de Centroamérica hasta Colombia y Venezuela, y por todas las Antillas. Mide hasta 10 pulgadas de largo. Es muy común en campos, parques, patios, jardines y áreas urbanas, donde caza al vuelo abejas, moscas, mariposas, libélulas y otros insectos. A veces come orugas, lagartijos y frutas. Algunos pitirres se alimentan de noche cerca de los postes del alumbrado. Anida mayormente de abril a agosto. La pareja construye un nido de plataforma sobre un árbol, arbusto, antena de televisión o incluso un poste. La hembra deposita de dos a cinco huevos rosáceos con pintas oscuras que ella misma empolla y de los cuales casi siempre se crían dos pichones. La pareja defiende el nido agresivamente, volando hacia el intruso y picoteándolo sin importar su tamaño, costumbre de la cual deriva el refrán cada guaraguao tiene su pitirre.

Se distingue por su cuerpo gris oscuro por encima y gris bien pálido o blanco por debajo, con una banda oscura o antifaz a nivel de los ojos. La cola es larga y está ligeramente bifurcada. El pico es grueso. El nombre de la especie deriva de su voz cuando canta.

En la universidad es muy común en espacios abiertos y patios. Anida en árboles en muchos lugares del recinto. Foto por Antonio Iñigo.

Viuda Colicinta (*Vidua macroura*)

La Viuda Colicinta (*Pin-tailed Whydah*) reside todo el año en Puerto Rico. Fue introducida por el mercado de mascotas y se estableció en la década del 1970. Es nativa de África y la mayoría de las introducciones han llegado de Senegal. Mide unas 5 pulgadas sin contar el rabo. Habita en llanos y montañas bajas, mayormente en pastizales, campos, jardines y patios donde abunda la hierba. Fuera de la época reproductiva vuela en bandadas, alimentándose de semillas, granos e insectos pequeños. Durante el verano y el otoño el macho desarrolla la cola larga y se torna muy agresivo. Corteja a la hembra volando en círculos y frente a ella mientras canta y despliega la cola. La hembra pone de dos a cuatro huevos blancos en nidos de Diablitos, Veteranos y otros gorriones que crían los polluelos. A diferencia de otros parásitos de nidos, esta especie no destruye los huevos del hospedero.

El macho es blanco y negro, con el pico rojo y una larga cola en forma de cinta. Fuera del periodo reproductivo los dos sexos son pardo-grisáceos con líneas negras, el vientre pardo claro o grisáceo y el pico anaranjado. Los jóvenes tienen este mismo plumaje pero el pico es grisáceo.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios, a menudo mientras el macho corteja a la hembra posada en una rama o cable del tendido eléctrico. Foto por: José Mari.

Bienteveo (*Vireo latimeri*)

El Bienteveo (*Puerto Rican Vireo*) es autóctono o único de Puerto Rico. Abunda más en la mitad oeste de la isla y está ausente del extremo este. Mide unas 5 pulgadas. Habita en bosques húmedos y secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Se desplaza por el follaje denso en busca mayormente de insectos, aunque también consume arañas, lagartijos y frutas. Anida de marzo a julio. Ambos adultos construyen una taza honda, adornada con musgos y hebras de tela de araña, que fijan en una horqueta o contra las ramas de un arbusto o árbol. La hembra pone dos o tres huevos rosados con pintas pardas.

Se distingue por la cabeza gris, espalda verde oliva, pecho crema o blanco y abdomen amarillo pálido. Tiene dos medias lunas blancas alrededor de los ojos, el pico es ancho y rosado, y las patitas son grises. Los dos sexos son similares. En el Bosque Seco de Guánica los nidos del Bienteveo son intensamente parasitados por el Tordo Lustroso, que tira los huevos del nido y los sustituye por los suyos.

En la universidad se observa en franjas de bosques en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto por Antonio Iñigo.

Julián Chiví (*Vireo altiloquus*)

El Julián Chiví (*Black-whiskered Vireo*) reside en Puerto Rico de febrero a agosto, luego de lo cual parte a pasar el invierno en Sudamérica. Algunos individuos permanecen aquí todo el año. Anida también desde el sur de la Florida a través de la Antillas hasta islas al norte de Suramérica, e inverna desde Venezuela hasta el noroeste de Brasil. Mide unas 6.5 pulgadas. Habita en bosques húmedos y secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, manglares y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Explora activamente el follaje en búsqueda de insectos, arañas y frutas. Anida mayormente en mayo y junio. La hembra construye un nido hondo en forma de copa o canasta, ubicándolo por lo general en una horqueta alta. En el mismo deposita dos o tres huevos blancos con manchas pardas que ella misma empolla.

Se distingue por el plumaje verde oliva y el pecho blanco o crema. La cabeza tiene una franja pálida sobre el ojo, una línea oscura que lo atraviesa y otra línea oscura debajo del pico, de la cual deriva su nombre común en inglés. Los dos sexos son parecidos. El pico es negro, recto y ancho; las patas son gris claro. Su nombre deriva de su canto.

En la universidad se observa en franjas de arboleda, patios y jardines. Anida en la Finca Alzamora, en el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás de Biología. Foto por Olivier Vimont.